






♀ Befundbogen Präpubertät und Pubertät des Mädchens ♀

Entwicklung der Brust nach Tanner	Stadium
Fehlende Brustentwicklung, kein palpabler Drüsenkörper.	B1
Brustknospe: Vergrößerung des Warzenhofes, der Drüsenkörper wölbt sich vor.	B2
Vergrößerung des Brustgewebes, der Drüsenkörper ist größer als der Warzenhof.	B3
Knosperbrust: Drüse im Warzenbereich hebt sich gesondert von der übrigen Drüse ab.	B4
Ausgereifte Brust: Zurückweichen der Warzenverwölbung in die übrige Brustkontur.	B5



Entwicklung der Pubesbehaarung nach Tanner	Stadium
Keine Schambehaarung.	P1
Vereinzelt leicht pigmentierte lange Haare an den großen Schamlippen oder am Mons pubis.	P2
Stärkere und dunklere Behaarung, die sich in der Mittellinie über der Symphyse ausbreitet und auf Fotos sichtbar ist.	P3
Kräftige Behaarung wie bei der erwachsenen Frau, aber in geringerer Ausdehnung.	P4
Kräftige Behaarung wie bei der erwachsenen Frau, wobei die Behaarung bis zu den Leistenbeugen reicht und auf die Oberschenkelinnenseite übergreifen kann. Nach oben ist die Behaarung horizontal abgegrenzt.	P5



Angegeben werden der Mittelwert (●) und die Zwefache Standardabweichung.

(Largo & Prader, 1983)

Johnson & Johnson Informationsdienst

Postfach 10 40 41 • 40031 Düsseldorf

Tel.: 0211/4305-509 • Fax: 0211/4305-352

Abb. 2: Befundbogen Präpubertät und Pubertät des Mädchens